

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАНОЗЕРСКОГО ЗАКАЗНИКА (КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

Е.В. Шутова, Е.Л. Толмачева, Ю.А. Быков

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кандалакшский государственный природный заповедник», Кандалакша, Россия, e-mail: shutovakand@gmail.com

Государственный природный заказник федерального подчинения «Канозерский» находится в южной части Кольского полуострова между тремя крупными озерами – Канозеро, Пончозеро и Мунозеро. Он был образован в 1980 г. для сохранения мест зимнего скопления лосей. Заказник расположен в подзоне северной тайги, современная площадь составляет 65660 га. Преобладают сосновые леса, в значительной степени на зарастающих вырубках разного возраста. В меньшей степени представлены ельники. Более четверти площади заказника занимают болотные комплексы. По территории протекает несколько относительно крупных рек, общая протяженность которых в границах заказника составляет около 120 км, а ручьев более 200 км. Кроме этого в заказнике более 140 мелких и средних озер.

Первые полевые работы на территории заказника проводились в 1988–1989 годах. На их основании в «Проекте внутривозрастного устройства Канозерского государственного республиканского заказника» (1989) приведен список из 87 видов птиц, относящихся к 11 отрядам. Позднее орнитологических работ на этой территории не велось. С 2011 г. охрану территории заказника «Канозерский» осуществляет Кандалакшский государственный природный заповедник. С 4 по 8 июля 2012 г. сотрудниками заповедника проведены маршрутные учеты птиц в юго-восточной части заказника (устье р. Лямукса – оз. Сосновое – оз. Окуневое – д. Печекуры – оз. Тормозеро) (рис.). Общая протяженность маршрутов составила 55 км, осмотрено 20 озер разной величины. Всего зарегистрировано 67 видов птиц.




Схема расположения Канозерского заказника и территории, обследованной в 2012 г.

В результате, с учетом материалов 1988-89 гг., на территории Канозерского заказника отмечено 99 видов птиц, из них: гагарообразные – 1, поганкообразные – 1, гусеобразные – 14, соколообразные – 6, курообразные – 4, журавлеобразные – 1, ржанкообразные – 16, голубеобразные – 1, кукушкообразные – 1, совообразные – 5, стрижеобразные – 1, дятлообразные – 3, воробьинообразные – 45. Предположительно 85 видов гнездятся в этом районе (отмечены гнезда, выводки, территориальное поведение или виды гнездятся на сопредельных территориях), 3 вида отмечены здесь на пролете, 3 вида – летом в период линьки, у 8 видов статус не определен.

В 2012 г. к списку гнездящихся видов были добавлены деряба *Turdus viscivorus*, чиж *Spinus spinus*, овсянка-крошка *Emberiza pusilla* и, предположительно, черный стриж *Apus apus*, стаи которого (до 20 особей) ежедневно отмечали летающими с «визгом» над лесом. Из 67 видов, встреченных в 2012 г., 42 вида были обычными, для остальных зарегистрированы единичные встречи.

На озерах неоднократно отмечали пары чернозобых гагар *Gavia arctica*, стаи хохлатых чернетей *Aythya fuligula* и турпанов *Melanitta fusca* (по 10–50 птиц), иногда выводки чирка-свистунка *Anas crecca* и кряквы *Anas platyrhynchos*, в небольшом количестве кормящихся полярных крачек *Sterna paradisaea* и отдельные пары сизых чаек *Larus canus*. На реках и ручьях нередко были выводки большого крохала *Mergus merganser*, перевозчики *Actitis hypoleucos*, иногда отмечали выводки кряквы и чирка-свистунка. На болотах по берегам озер и внутри леса самыми обычными гнездящимися видами являются фифи *Tringa glareola*, желтая трясогузка *Motacilla flava* и луговой конек *Anthus pratensis*. Несколько реже отмечали больших улитов *Tringa nebularia*, щеголей *Tringa erythropus*, бекасов *Gallinago gallinago*, тростниковых овсянок *Emberiza schoeniclus* и овсянок-крошек. Изредка встречались здесь и другие виды куликов. Из лесных воробьиных птиц везде самыми многочисленными были пеночки-весники *Phylloscopus trochilus*, обычные вьюрки *Fringilla montifringilla*, лесные коньки *Anthus trivialis*, обыкновенные горихвостки *Phoenicurus phoenicurus*, белобровики *Turdus iliacus* и певчие дрозды *Turdus philomelos*, а в сухих сосняках нередко дерябы. В разных местах отмечали стайки чечеток *Acanthis flammea*, чижей и три вида клестов. Из куриных птиц самыми обычными были тетерева *Lururus tetrix*, из дятлов – большие пестрые *Dendrocopos major*. Из хищных птиц и сов только дербник *Falco columbarius* отмечен в нескольких местах, для остальных видов – единичные встречи.

Естественно, полученный список далеко не полный, и расширяться он будет за счет редких и малочисленных гнездящихся, пролетных и залетных видов. В дальнейшем эта работа будет продолжена.